

Скрининг CRAFFT: Интервью

Начните с: “ Я задам вам несколько вопросов, которые я обычно задаю всем моим пациентам. Пожалуйста будьте откровенны. Я гарантирую конфиденциальность ваших ответов.”

Часть А

За последние 12 месяцев, делали ли вы следующее:	Нет	Да
1. Употребляли <u>алкоголь</u> (более нескольких глотков)? (За исключением употребления алкоголя во время семейных торжеств или религиозных мероприятий.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Курили <u>марихуану</u> или <u>гашиш</u> ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Употребляли <u>что-нибудь другое</u> , чтобы получить «кайф»? (“ <u>что-нибудь другое</u> ” включает запрещенные наркотики, сильнодействующие лекарства (по рецепту и без рецепта) и вещества, которые можно нюхать и “вдыхать”.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Только для Сотрудников Клиники: Ответил(а) ли пациент (ка) “да” на все вопросы в Части А?

Нет



Да



Задайте ему/ей только вопросы
CAR, затем прекратите опрос

Задайте ему/ей все 6 вопросов
CRAFFT

Часть В

	Нет	Да
1. Вы когда-нибудь сели в <u>МАШИНУ</u> , за рулем которой находился человек (включая вас) в состоянии алкогольного опьянения, под действием наркотиков или “под кайфом”?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Вы когда-нибудь употребляли алкоголь или наркотики для того, чтобы <u>РАССЛАБИТЬСЯ</u> , самоутвердиться или “вписаться”??	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Вы когда-нибудь употребляли алкогольные напитки или наркотики без друзей, <u>В ОДИНОЧКУ</u> ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Вы когда-нибудь <u>ЗАБЫВАЕТЕ</u> то, что делали под влиянием алкогольных напитков или наркотиков?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Ваши родственники или <u>ДРУЗЬЯ</u> когда-нибудь говорили вам, что вам нужно меньше пить или употреблять меньше наркотиков?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Вы когда-нибудь попадали в <u>НЕПРИЯТНОСТИ</u> , находясь под влиянием алкогольных напитков или наркотиков?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Конфиденциальность:

Вышеизложенная информация может быть защищена специальными федеральными законами о конфиденциальности (42 CFR Часть 2), которые запрещают разглашение данной информации без письменного согласия субъектов персональных данных. Общее разрешение на разглашение медицинской информации НЕ является достаточным.


© Детская больница Бостона, 2009. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ.

Воспроизведено с разрешения Исследовательского Центра Употребления Наркотиков и Алкоголя среди Подростков, CeASAR, Детская больница Бостона.
(www.ceasar.org)

Инструкции по Определению Результатов: Только для Сотрудников Клиники

Определение Результатов CRAFFT: Каждый ответ “да” в Части В получает 1 балл.
Общий результат в 2 или выше балла означает положительный тест, требующий дополнительной проверки.

Вероятность Диагноза Употребления Наркотиков и Алкоголя/Зависимости на основании результатов CRAFFT ^{1,2}



Диагностические Критерии DSM-IV³ (Сокращенный вариант)

Употребление Наркотиков и Алкоголя (1 или более из нижеуказанного):

- Употребление ведет к невыполнению обязательств на работе, в учебном заведении или дома
- Периодическое употребление в ситуациях, которые могут привести к трагедиям (напр., вождение автомобиля)
- Постоянные проблемы с нарушением законов
- Продолжение употребления, несмотря на постоянно возникающие проблемы

Наркотическая и Алкогольная Зависимость (3 или более из нижеуказанного):

- Толерантность
- Уход от реальности
- Наркотики и алкоголь, употребляемые в большем количестве или в течение более длительного периода времени, чем планировалось
- Безуспешные попытки снизить дозу или «завязать»
- Затрата значительного времени на добывание наркотиков или алкоголя или лечение и реабилитация после их употребления
- Отказ от важных дел в результате употребления наркотиков или алкоголя
- Продолжение употребления, несмотря на пагубные последствия

© Детская больница Бостона, 2009. Данный документ может быть воспроизведен в точном соответствии с оригиналом для употребления в медицинских целях, Исследовательский Центр Употребления Наркотиков и Алкоголя среди Подростков, Детская больница Бостона, 300 Longwood Ave, Boston, MA 02115, U.S.A., (617) 355-5433, www.ceasar.org.

Литература:

1. Knight JR, Shrier LA, Bravender TD, Farrell M, Vander Bilt J, Shaffer HJ. A new brief screen for adolescent substance abuse. [Новый короткий скрининг употребления наркотиков среди молодежи] Arch Pediatr Adolesc Med 1999;153(6):591-6.
2. Knight JR, Sherritt L, Shrier LA, Harris SK, Chang G. Validity of the CRAFFT substance abuse screening test among adolescent clinic patients. [Точность CRAFFT скрининга употребления наркотиков среди молодых пациентов клиники] Arch Pediatr Adolesc Med 2002;156(6):607-14.
3. American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders [Диагностическое и статистическое руководство по психическим расстройствам], fourth edition, text revision. Washington DC, American Psychiatric Association, 2000.

