

Exposición de los niños al plomo



6 acciones para reducir los riesgos de su

1. Lavarse las manos y los juguetes con frecuencia
2. Dejar los zapatos (y la ropa sucia) en la Puerta.
3. Trapear en húmedo para quitar el polvo.
4. Crear barreras a la posible pintura con plomo.
5. Mantener las ventanas cerradas.
6. Comer una dieta balanceada. **Hierro, calcio, magnesio y vitaminas C y D**

Este documento fue respaldado por la American Academy of Pediatrics (Academia Americana de Pediatría, AAP) y financiado (en parte) por el acuerdo cooperativo número 1 NU61TS000296-01-00 de Agency for Toxic Substances and Disease Registry). Reconocimiento: La Environmental Protection Agency (Agencia de Protección Ambiental, EPA) de EE. UU. respalda a PEHSU dándole financiamiento parcial a la ATSDR según el acuerdo entre agencias número DW-75-95877701.

Esta hoja informativa es únicamente para fines educativos e informativos y no se debe usar con fines comerciales. El material no pretende sustituir el juicio médico independiente o el consejo de un médico o profesional de atención médica calificado. Los usuarios que decidan usar la información o las recomendaciones disponibles en esta hoja informativa lo hacen por su cuenta y riesgo y no deben confiar en esa información como una recomendación médica profesional ni usarla para sustituir cualquier relación con sus médicos u otros profesionales de atención médica calificados.

© 2023 Boston Children's Hospital. Todos los derechos reservados